

# ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

## ZASADY OGÓLNE

- W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób. Należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty oraz zorganizować rejestrację tak, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1,5 m.
- Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (można wykorzystać pytania z ankiety kwalifikacji – zał. nr 1) oraz poinformować o obowiązujących w placówce środkach ostrożności.
- Podczas rozmowy telefonicznej bądź drogą mailową terapeuta lub właściciel placówki może przeprowadzić typowy krótki wywiad z Rodzicem Pacjenta celem zmniejszenia czasu kontaktu/ ekspozycji małego pacjenta na ewentualne patogeny (załącznik nr 2 – Ankieta pediatryczna).
- Przy wejściu do Placówki każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
- Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) powinien otrzymać, wypełnić i podpisać przed każdą wizytą ankietę kwalifikacji bądź przy kolejnym spotkaniu aktualizację ankiety (załącznik nr 1 – Ankieta kwalifikacji) dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.
- Terapeuta oraz osoby współpracujące z nim podczas procesu terapeutycznego muszą przed rozpoczęciem pracy każdego dnia wypełnić i podpisać aktualizację ankiety (załącznik nr 1 – Ankieta kwalifikacji) dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.
- W placówce wytycza się strefy bezpieczeństwa pacjentów. Każdy pacjent do gabinetu wchodzi wyłącznie w towarzystwie terapeuty co umożliwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie placówki.
- Grafiki przyjmowania pacjentów układany jest tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m.
- Umożliwia się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu) kolejną dezynfekcję rąk przy wejściu do gabinetu i przy jego opuszczeniu.
- Personel jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (jednorazowe lub wielorazowe).
- Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu usługi możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, jednakże opiekun pacjenta posiada jednorazową maseczkę ochronną oraz jednorazowe

rękawice, w które sam się zaopatruje. Rękawiczki należy zdezynfekować przed wejściem do gabinetu.

- W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub prezentujących 3,4,5 st. w skali GMFCS, czy głęboki poziom niepełnosprawności należy zobowiązać przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych.
- Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun.
- Rodzic/ Opiekun przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po zmianie pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamkniętego kosza z czerwonym workiem, a następnie myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i ubiera nowe rękawiczki.
- Podczas udzielania świadczeń ambulatoryjnych unika się zbyt dużego obłożenia/zagęszczenia w placówce.

## **PRZYJĘCIE PACJENTA**

- W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie znaczącego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 - **zasadna jest odmowa udzielania świadczenia.**
- W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) – stwierdzenie niewielkiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2/ - **udzielenie świadczenia przy zachowaniu standardowych form ostrożności:**
  - Terapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi standardami. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się przy każdym węźle sanitarnym.
  - Należy zadbać o częste przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady
  - Przybory, aparatura medyczna i sprzęt, zabawki używane podczas terapii powinny zostać przed i po zakończeniu pracy zdezynfekowane.